



COVID-19 ŞÜPHELİ/ TANILI HASTALARDA HASTANE İÇİ KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON (KPR)

Kurtarıcılar kontaminasyon açısından kendi güvenliğini sağlamalıdır (kişisel koruyucu ekipman (KKE) olan önlük, çift eldiven, bone, N95 maske, FFP3, gözlük, siperlik)

Omuzlarından sarsarak, nasılsınız diye seslenerek bilinç kontrolü yapınız

Yaşam belirtilerinin ve normal solunumun olmadığına görülmesi ile kardiyak arresti teyid ediniz

Eğer eğitiminiz var ise **karotis nabzını** kontrol ediniz

BAK-DİNLE-HİSSET YAPMAYINIZ

Kardiyak arrest tanısı hakkında herhangi bir şüphe varsa, göğüs kompresyonlarına derhal başlayınız

En kısa zamanda ritmi görebilmek için **monitörize** ediniz

Ağızdan ağıza ventilasyondan kaçınınız ve cep maskesi kullanmayınız

Hasta maskeyle oksijen tedavisi alıyorsa, göğüs kompresyonları sırasında maskenin hastanın yüzünde kalmasını sağlayınız, hastanın yüzünü şeffaf örtü ile örtünüz

Şok uygulanabilir ritimleri hızla **DEFİBRİLE** ediniz

En kısa sürede supraglottik hava yolu gereci ya da entübasyonu gerçekleştiriniz

KPR sırasında geri döndürebilir nedenleri 4H, 4T'yi (örn. şiddetli hipoksemi) düşününüz

Kullanılan tüm ekipmanları, öneriler doğrultusunda imha ediniz veya temizleyiniz

Kurtarıcı KPR sonrası uygun şekilde hijyen kuralları doğrultusunda temizleniniz